




Baum-Weißling

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)

BESCHREIBUNG

Flügelspannweite: 5 bis 7,7 cm. **Flügeloberseite:** ist weiß mit einer sehr ausgeprägten schwarzen Flügelädern. **Flügelunterseite:** ist weiß oder blassgelb, unterschiedlich bei den einzelnen Exemplaren, mit schwarzen zerstreuten Schuppen und einer sehr ausgeprägten schwarzen Flügelädern.

ABBILDUNG ZUR IDENTIFIZIERUNG





ÄHNLICHE ARTEN

Man kann ihn aufgrund seiner Farbe, Flügeläderung und dem Fehlen eines Musters nicht mit anderen Arten verwechseln.

BIOLOGIE UND LEBENSRAUM

Es gibt eine Generation pro Jahr, die zwischen Mai und Juni fliegt. Er lebt in gut erhaltenen Waldgebieten mit dichten Unterholz, auf einer Höhe von 300 Metern, wo die Nahrungspflanzen der Raupen, Eingriffeliger Weißdorn (*Crataegus monogyna*), Schlehdorn (*Prunus spinosa*) und der Birnenbaum *Pyrus bourgaeana* vorkommen.

Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

VERBREITUNG

Normalerweise kommt er sehr selten in der Region Málagas vor und wenn, dann an ganz bestimmten Stellen. Auf dem GWM kann man ihn auf den Etappen durch das Bergland von Ronda, dem Zentralen Kalksteinbogen (Arco Calizo Central) und an bestimmten Stellen im Norden der Region, wo zwischen dem Unterholz der alten Steineichen Hagedorn wächst, beobachten. Es ist nicht auszuschließen, Kolonien auch auf den Etappen durch die Gebirge Tejada und Almiraj und im Genal Tal zu entdecken.

