




Argus iridié

Polyommatus albicans (Gerhard, 1851)

DESCRIPTION

Envergure des ailes : entre 2,8 et 4,2 cm. **Ailes fermées** : le mâle est de couleur crème ou blanchâtre, la femelle, marron. Les deux sexes ont des cils en damier, un point dans la cellule de l'aile antérieure et des petits points sur l'aile postérieure, parfois absents – surtout chez le mâle – ainsi que des taches orange sur le bord postérieur, de petite taille ou inexistantes. **Ailes ouvertes** : il montre rarement sa partie intérieure. Le mâle a le corps et la base des ailes bleu ciel, sa nervation est foncée et il a une large bordure noire sur l'aile antérieure, celle de la postérieure étant fine avec des points noirs. La femelle est entièrement marron, avec des anneaux blanchâtres ou orangés le long du bord arrière de l'aile postérieure.

CLÉ DE DÉTERMINATION VISUELLE



ESPÈCES RESSEMBLANTES

Argus bleu : ses taches orange sont plus grandes, avec un peu de noir à l'intérieur. **Azuré platiné** : il n'a pas de point dans la cellule, le marron est très clair ou blanchâtre et ses taches orange pointues. **Azuré de l'esparcette** : il n'a pas de point dans la cellule, ses taches sont plus grandes et pointues. **Azuré du plantain** : les points de ses séries sont très grands, il n'a pas de point dans la cellule et ses taches orange ont les pointes noires. **Bel argus** : le bas de ses taches orange est bordé de noir et ses points sont plus grands.




Argus bleu



Azuré platiné



Azuré de l'esparcette



Azuré du plantain



Bel argus

BIOLOGIE ET HABITAT

Il vole entre juin et septembre, plus abondamment en juillet, en une seule génération annuelle.

Il vit dans les milieux montagneux ouverts, souvent dans des zones dégradées comme les prairies de graminées ou de légumineuses, les rocaïles et les clairières de forêts ou de garrigues, à une altitude comprise entre 700 et 1850 m. Les chenilles s'alimentent de légumineuses du genre *Hippocrepis*.

JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC
-----	-----	-----	-----	-----	------	------	-----	-----	-----	-----	-----

DISTRIBUTION

Il peut être observé sur le GSM en petit nombre et de façon localisée sur les étages des sierras de Tejeda et Almijara, de l'Arc calcaire central, du nord de la province et de la région de Ronda. Il n'est pas impossible qu'il soit mieux représenté sur les territoires du nord et présent dans la vallée du Genal.

