Azuré du plantain

Polyommatus escheri (Hübner, 1823)

DESCRIPTION

Envergure des ailes : entre 2,8 et 4 cm. **Ailes fermées :** le mâle est grisâtre, la femelle marron clair. Il présente de fines taches orange, légèrement plus grandes chez la femelle, avec un bord noir pointu très visible. Il n'y a pas de point dans la cellule. Il a une série de points de grande taille, en particulier chez la femelle, dont deux sont collés et décalés vers l'extérieur, brisant l'arc et lui donnant un aspect de « ? ». **Ailes ouvertes :** il est peu habituel de le voir ainsi. Le mâle est bleu vif, alors que la femelle est marron, avec une large frange orange le long du bord extérieur de chaque aile.

CLÉ DE DÉTERMINATION VISUELLE



ESPÈCES RESSEMBLANTES

Argus bleu : il a un point dans la cellule ainsi que des taches plus grandes finement bordées de noir à l'intérieur ; les points sont plus petits. **Azuré platiné :** il est marron très clair ou blanchâtre avec des taches orange dont la pointe ne présente que très peu de noir. **Azuré de l'esparcette :** ses points son plus petits, ses taches orange plus grandes et pointues avec très peu de noir au bout. **Argus iridié :** le mâle et la femelle ont une série de très petits points sur l'aile postérieure, parfois absents, de même que les taches orange du bord externe ; ses cils sont en damier et il a un point dans la cellule. **Bel argus :** ses cils sont en damier et il a un point dans la cellule.

Argus bleu

Azuré platiné

Azuré de l'esparcette

Femelle — Argus iridié — Mâle

Bel argus

BIOLOGIE ET HABITAT

Son unique génération annuelle vole de fin mai à juillet. Papillon typique des milieux montagneux, entre 1050 et 1900 m d'altitude, il préfère généralement les habitats ouverts, comme les clairières de forêts, la garrigue éparse, les prairies de légumineuses et les herbages. Les chenilles s'alimentent de légumineuses basses, principalement l'astragale blanchâtre (*Astragalus incanus*), mais aussi l'astragale de Montpellier (*Astragalus monspessulanus*) et l'astragale de Catalogne (*Astragalus nevadensis*).

JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

DISTRIBUTION

Il est très rare et localisé dans la province de Malaga. Sur le GSM, il n'a été observé qu'à un endroit de l'Arc calcaire central, sur l'étape 11. Il pourrait également être présent dans les zones les plus élevées de la 23. Nous vous prions de bien vouloir nous signaler toute observation de l'espèce.