Bel argus

Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775)

DESCRIPTION

Envergure des ailes : entre 2,5 et 3,2 cm. **Ailes fermées :** le mâle est grisâtre ou brunâtre, la femelle, marron. Ses cils sont en damier. Il a un point dans la cellule de l'aile antérieure et de grands points sur la postérieure, dont deux sont unis et décalés vers l'extérieur, ce qui lui donne un aspect de « ? ». Il présente des taches orange arrondies, dont le bas est finement bordé de noir. **Ailes ouvertes :** il est difficile de le voir ainsi. Les deux sexes ont des cils en damier, le mâle est bleu ciel, alors que la femelle est marron, avec des taches orangées sur le bord externe des deux ailes.

CLÉ DE DÉTERMINATION VISUELLE

ESPÈCES RESSEMBLANTES

Argus bleu : ses points sont plus petits et ses cils unis. **Azuré platiné :** il est marron très clair ou blanchâtre, sans point dans la cellule ; ses points sont plus petits, les taches orange pointues et les cils unis. **Azuré de l'esparcette :** il n'a pas de point dans la cellule, ses points sont plus petits, les taches orange pointues et les cils unis. **Azuré du plantain :** il n'a pas de point dans la cellule et ses cils sont unis. **Argus iridié :** les points de l'aile postérieure sont beaucoup plus petits ; les taches orange sont très réduites ou absentes.

Argus bleu

Azuré platiné

Azuré de l'esparcette

Azuré du plantain

Femelle

Argus iridié — Mâle

BIOLOGIE ET HABITAT

Avec ses trois générations, il vole pratiquement toute l'année, principalement entre mars et août. Ses habitats de prédilection sont les milieux forestiers et les garrigues bien conservés, où on le trouve normalement dans les prairies et les herbages, souvent dans des zones peu sauvages, à moins de 1300 m d'altitude. C'est là qu'il trouve les chenilles de ses plantes nourricières, les légumineuses des genres *Coronilla, Anthyllis* et *Hippocrepis*.

JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC

DISTRIBUTION

Il est bien représenté sur le GSM, quoique toujours en petite nombre et très localisé. Il est absent des étapes côtières et des plus transformées du nord de la province. Il pourrait toutefois rester quelques populations reliques dans les lieux où la végétation autochtone est encore présente.