



Chevron blanc

Hipparchia fidia (Linnaeus, 1767)

DESCRIPTION

Envergure des ailes : entre 4,8 et 6,2 cm. **Ailes fermées** : il est gris argenté, marbré de marron, avec deux grands ocelles sur l'aile antérieure, cerclés de jaune et avec un point blanc au milieu ; normalement, seul celui proche de l'apex est visible. L'aile postérieure comporte deux larges lignes anguleuses, en particulier celle du haut, avec un angle très marqué sur la partie centrale ; une autre petite ligne est placée entre les deux lignes principales et une quatrième se trouve parallèle et proche du bord postérieur. Il présente également une grande tache marron-grisâtre entre la ligne du bord et celle du milieu ainsi qu'un point noir près de l'angle anal. **Ailes ouvertes** : il se montre ainsi seulement occasionnellement, lorsqu'il se bat contre d'autres papillons. Il est marron foncé avec les deux ocelles bien visibles, en particulier chez la femelle, car ils sont cerclés de jaune et ont une tache blanche adossée à chacun d'entre eux. La femelle a un cercle également autour de celui de l'aile postérieure et des taches jaunâtres sur l'aile antérieure. Le mâle n'a pas de jaune sur les ailes mais conserve les taches blanches.

CLÉ DE DÉTERMINATION VISUELLE

Ocelle noir, cerclé de jaune et point blanc au centre




Foto: Francisco Rios Bosquet


Taches jaunâtres

Épaisses lignes noires anguleuses

FEMELLE

Deux ocelles cerclés de jaune

Taches blanches



Petit ocelle

ESPÈCES RESSEMBLANTES

Faune : il est généralement plus petit avec une moindre proportion de marron sur les ailes ; les lignes qui traversent l'antérieure sont plus étroites, celle du milieu étant nettement arrondie, et il n'y a pas de ligne sur le bord arrière de l'aile postérieure.



BIOLOGIE ET HABITAT

Il a une seule génération annuelle, mais avec une période d'émergence très prolongée : sur un même lieu, des individus peuvent naître de fin mai jusqu'à septembre, ces derniers pouvant voler une bonne partie d'octobre. Il préfère les habitats ouverts, secs et chauds, les forêts ouvertes et la garrigue des versants très pentus, les rocaïlles et les prairies de graminées. Ses chenilles s'alimentent d'alfas (*Stipa spp.*) et d'autres graminées comme les brachypodes (*Brachypodium spp.*) et les fétuques (*Festuca spp.*).

JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC
-----	-----	-----	-----	-----	------	------	-----	-----	-----	-----	-----

DISTRIBUTION

Il est largement distribué sur le GSM et abonde tout particulièrement dans les zones les plus sèches et ensoleillées des sierras du littoral et de celles de Tejeda et Almijara, alors que sur les autres étapes il est plus rare et localisé, surtout sur celles du littoral, de la Axarquía, du nord de la province et de la vallée du Genal.

