



Citron de Provence


Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767)

DESCRIPTION


Envergure des ailes : entre 4,5 et 6,8 cm. Espèce à l'aspect très arrondi, avec un appendice pointu sur chaque aile (sur l'antérieure au niveau de l'apex et au bord anguleux, sur la postérieure au milieu de l'aile). **Ailes fermées** : le mâle est verdâtre sur les deux ailes ; si l'antérieure est dépliée, il laisse apparaître du jaune vif vers l'intérieur ou du orange s'il se trouve à contre-jour ; la femelle est vert pâle, avec une bande jaunâtre ou orangée sur l'aile antérieure, qui se détache sur le reste de l'aile. **Ailes ouvertes** : il se montre rarement ouvert ; le mâle peut être reconnu en vol, par sa grande taille et la tache orange qui occupe presque la totalité de l'aile antérieure ; la femelle est blanchâtre et impossible à identifier en vol, mais, posée, on pourra reconnaître la forme anguleuse du bord de l'apex.

CLÉ DE DÉTERMINATION VISUELLE

En vol, la grande tache orange qui occupe presque toute l'aile est bien visible



Bande jaunâtre ou orangée, se détachant sur la tonalité du reste de l'aile



ESPÈCES RESSEMBLANTES

Citron : le mâle, avec les ailes ouvertes (peut fréquenter) ou en vol, ne présente pas d'orange sur l'aile antérieure, il est intégralement jaune vif ; avec les ailes fermées, il n'est pas aussi verdâtre, mais plutôt jaunâtre et le bord inférieur de l'apex de l'aile antérieure est arrondi. La femelle fermée ne possède pas de bande jaunâtre ou orangée sur l'aile antérieure, parallèle au bord supérieur, ce qui fait que cette zone ne se détache pas sur la couleur blanchâtre ou verdâtre du reste de l'aile ; en outre, le bord inférieur de l'apex est anguleux, et non arrondi.



BIOLOGIE ET HABITAT

Il vole toute l'année et sa biologie est relativement similaire à celle du Citron : une seule génération qui hiverne, mais, le Citron de Provence, lui, se réveille les douces journées d'hiver, en profitant pour chercher un/e partenaire et se reproduire. Cependant, ils sortent normalement de leur léthargie durant le printemps, principalement en mars, et c'est au mois de juin qu'émerge une bonne partie de la nouvelle génération, descendance des hivernants. Il partage son habitat avec les plantes nourricières avec le Citron, mais il est plus répandu et plus abondant. On peut ainsi le voir dans tous types d'environnements forestiers et dans la garrigue, même quelque peu dégradés, et souvent dans des lieux relativement humides et ombragés, autour des rivières, des ruisseaux et des torrents.

JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOÛ	SEP	OCT	NOV	DÉC
-----	-----	-----	-----	-----	------	------	-----	-----	-----	-----	-----

DISTRIBUTION

Sa distribution sur le GSM est très proche de celle du Citron, il est toutefois moins localisé et plus abondant. Comme son congénère, il est peu probable de le trouver sur les itinéraires côtiers et il sera moins présent sur les étapes du nord de la province, sauf autour des cours d'eau conservant une végétation autochtone et accueillant ses plantes nourricières.

